



Outil d'évaluation et de décision

- I IDENTIFIEZ la présence de cathéter(s)**
Vérifier la présence de cathéters (Relevez les manches, observez les pieds du bébé...) à l'arrivée du malade dans l'unité et à chaque retour d'un plateau technique.
- D DÉTERMINEZ si ce(s) cathéter(s) est toujours nécessaire ?**
En absence de traitement IV, qu'il soit continu ou intermittent, ou de ponctions veineuses répétées (> 3 / jour), le cathéter doit être retiré sans délai. Discutez avec le médecin du retrait d'un cathéter qui n'a pas été utilisé dans les 24 heures précédentes et ne doit pas l'être dans les 24 h suivantes.
- E EVALUEZ le fonctionnement du cathéter**
Rinçage aisé, retour veineux présent.
- C CHANGEZ le pansement sans délai s'il est souillé, humide ou décollé et sécurisez le cathéter et les lignes pour éviter tout déplacement.**
- I IMPRÉGNEZ vos compresses d'antiseptique et DÉSINFECTEZ VOS MAINS avant toute manipulation du cathéter. Indispensable pour réduire le risque d'infection liée à ce cathéter.**
- D DÉPISTEZ tout signe de complication**
Douleur ressentie, rougeur au point de ponction ou sur le trajet du cathéter, gonflement du membre, présence de pus ?
- E EXPLIQUEZ au malade (et/ou à ses proches) comment veiller au bon fonctionnement du cathéter et au bon déroulement de son traitement.**
- D DÉCRIVEZ ET DATEZ vos actions dans le dossier**
Maintien ou retrait du cathéter, changement du pansement.

*Tenez toujours compte des directives locales,
et consulter l'équipe et le patient au besoin.*